URGENCIA.pt

ALGORITMO DE ABORDAGEM

PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE

Diagnóstico de PAC provável

História clínica, exame objetivo

Determinar local de tratamento

História clínica; exame objetivo; escalas CRB-65, CURB-65 ou PSI; outros fatores subjetivos

Sem necessidade de internamento

Com necessidade de internamento

Internamento hospitalar

Critérios para realizar Rx tórax?

- Dúvidas acerca do diagnóstico
- Risco de patologia pulmonar subjacente
- Evolução insatisfatória depois de iniciado o tratamento

Comorbilidades ou antibioterapia nos últimos 3 meses

Comorbilidades: DPOC; diabetes mellitus; doença cardíaca, hepática ou renal crónicas; neoplasia; alcoolismo; esplenectomia.

Não

Amoxicilina
500mg 8/8h

Sim

Amoxicilina
1g 8/8h

+

Azitromicina
500 mg / dia

ou

Claritromicina
500 mg 12/12h

ou

Doxiciclina
200 mg dose inicial, depois100mg 12/12h

Reavaliação até 72 horas de tratamento

Sem Melhoria

Melhoria

Continuar tratamento

Adaptado a partir da norma DGS 045/2011 e publicado no site **URGENCIA**.pt